

Volumenberechnungen mit Integralen: Rotationskörper


Volumenberechnung bei Rotation um die x-Achse

Für das Volumen des Drehkörpers / Rotationskörpers, der entsteht, wenn der Graph einer stetigen Funktion $f(x)$ über einem Intervall $[a; b]$ um die x-Achse rotiert, gilt:

$$V = \pi \cdot \int_a^b (f(x))^2 dx$$

Anmerkungen:

- Die Grenzen a und b dürfen auch Nullstellen des Graphen sein.
- Der Graph darf auch auf beiden Seiten der x-Achse verlaufen.
- Wir benötigen die Stammfunktion der quadrierten Funktion, **nicht** die quadrierte Stammfunktion.



Beispiel:


Gegeben: $f(x) = -\frac{1}{2}x - 1$; $I = [2; 4]$

Deren Quadrat: $h(x) = (f(x))^2 = \left(-\frac{1}{2}x - 1\right)^2 = \frac{1}{4}x^2 + x + 1$

Die Stammfunktion: $H(x) = \frac{1}{12}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x$

Das Volumen:

$$\begin{aligned}
 V &= \pi \cdot \int_a^b (f(x))^2 dx \\
 &= \pi \cdot \int_a^b h(x) dx \\
 &= \pi \cdot [H(x)]_a^b \\
 &= \pi \cdot \left[\frac{1}{12}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x \right]_2^4 \\
 &= \pi \cdot \left(\left(\frac{1}{12} \cdot 4^3 + \frac{1}{2} \cdot 4^2 + 4 \right) - \left(\frac{1}{12} \cdot 2^3 + \frac{1}{2} \cdot 2^2 + 2 \right) \right) \\
 &= \dots \\
 &= \underline{\underline{\frac{38}{3} \cdot \pi \text{ (VE)}}}} \quad \approx \underline{\underline{39,79 \text{ (VE)}}}
 \end{aligned}$$




Volumenberechnung bei Rotation um die x-Achse zwischen zwei Graphen

Für das Volumen des Drehkörpers / Rotationskörpers, der entsteht, wenn die Fläche zwischen den Graphen zweier stetiger Funktion $f(x)$ und $g(x)$ mit $f \geq g \geq 0$ über einem Intervall $[a; b]$ um die x-Achse rotiert, gilt:

$$V = V_f - V_g = \pi \cdot \int_a^b (f(x))^2 - (g(x))^2 dx$$

Anmerkungen:

- Die Grenzen a und b dürfen auch Schnittpunkte der Graphen sein.
- Die Bedingung $f \geq g \geq 0$ ist zu beachten. gegebenenfalls müssen wir mehrere Intervalle, also mehrere Integrale betrachten, dort dann die Rollen von f und g tauschen.
- Wir benötigen die Stammfunktionen der quadrierten Funktionen, nicht die quadrierten Stammfunktionen.



Beispiel:

Es seien $f(x) = \sqrt{2x}$ und $g(x) = \sqrt{x}$
sowie $a = 0$ und $b = 4$ gegeben.

Das zu berechnende Volumen ist die Differenz der beiden Rotationskörper, die entstehen, wenn die Graphen jeweils um die x-Achse rotieren. Wir ziehen also das kleinere Volumen vom größeren ab:

Wir erkennen, dass für alle $x \geq 0$ gilt: $f(x) = \sqrt{2x} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{x} \geq \sqrt{x} = g(x)$.

Die 1. Funktion: $f(x) = \sqrt{2x} \Rightarrow$ Deren Quadrat: $(f(x))^2 = h_f(x) = \sqrt{2x}^2 = 2x$
 \Rightarrow Deren Stammfkt.: $H_f(x) = x^2$

Die 2. Funktion: $g(x) = \sqrt{x} \Rightarrow$ Deren Quadrat: $(g(x))^2 = h_g(x) = \sqrt{x}^2 = x$
 \Rightarrow Deren Stammfkt.: $H_g(x) = \frac{1}{2}x^2$

Das Volumen:

$$\begin{aligned} V &= \pi \cdot \int_0^4 (f(x)^2 - g(x)^2) dx = \pi \cdot [H_f(x) - H_g(x)]_0^4 \\ &= \pi \cdot \left[x^2 - \frac{1}{2}x^2 \right]_0^4 = \pi \cdot \left[\frac{1}{2}x^2 \right]_0^4 \\ &= \pi \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 4^2 - \frac{1}{2} \cdot 0^2 \right) = \pi \cdot (8 - 0) \\ &= \underline{8 \cdot \pi \text{ (VE)}} \approx \underline{25,13 \text{ (VE)}} \end{aligned}$$